

## PARTIE III : RENSEIGNEMENTS AU CONSOMMATEUR

### DULCOLAX® Dragées de bisacodyl

Ce dépliant fait partie du Guide thérapeutique publié pour DULCOLAX et s'adresse spécifiquement aux consommateurs. Ce dépliant sert de résumé et, par conséquent, ne contient pas tous les renseignements disponibles au sujet de DULCOLAX. Veuillez communiquer avec votre médecin ou votre pharmacien si vous avez des questions concernant ce médicament.

#### AU SUJET DE CE MÉDICAMENT

##### À quoi sert ce médicament :

DULCOLAX est utilisé pour le soulagement de la constipation occasionnelle.

Pour la préparation du patient à une intervention diagnostique, pour un traitement pré- ou postopératoire et dans les cas où la défécation doit être facilitée, DULCOLAX doit être utilisé sous supervision médicale.

##### Comment agit ce médicament :

DULCOLAX appartient à un groupe de médicaments nommés laxatifs stimulants. DULCOLAX stimule les muscles intestinaux tout en favorisant l'accumulation d'eau dans les intestins. Cet effet permet de ramollir les selles et d'en faciliter le passage.

##### Quand ne devrait-on pas utiliser ce médicament :

- Si vous avez une douleur abdominale grave accompagnée de nausées et de vomissements.
- Si vous avez une occlusion intestinale (iléus), une maladie intestinale inflammatoire aiguë ou une appendicite.
- Si vous souffrez de déshydratation grave.
- Si vous avez une allergie au médicament ou à tout ingrédient contenu dans le produit (voir les ingrédients non médicinaux).
- Si vous avez une maladie héréditaire rare d'intolérance au galactose ou au fructose, vous ne devriez pas prendre les dragées DULCOLAX.
- Si vous avez une allergie au colorant tartrazine, vous ne devriez pas prendre les dragées DULCOLAX.

##### Ingrédient actif :

Bisacodyl

##### Principaux ingrédients non médicinaux :

Les dragées entérosolubles contiennent : acacia, cire d'abeille, cire de carnauba, amidon de maïs, phtalate de dibutyle, eudragit, glycérine, lactose, stéarate de magnésium, polyéthylène glycol, sucrose, talc, tartrazine (jaune), et dioxyde de titane.

##### Présentations :

Dragées à 5 mg

Suppositoires à 5 mg (enfants) et 10 mg (adultes).

#### MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS

##### **AVANT de prendre DULCOLAX, veuillez aviser votre médecin ou pharmacien :**

- Si vous avez eu une réaction allergique à ce médicament ou à tout autre médicament.
- Si vous avez une douleur abdominale, des crampes à l'estomac, de la fièvre, des nausées ou des vomissements.
- Si vous êtes enceinte ou allaitez.
- Si vous prévoyez donner DULCOLAX à un enfant.
- Si vous avez pris DULCOLAX pendant une semaine sans constater d'effet.
- Si vous prenez tout autre médicament, y compris ceux vendus sans ordonnance, des herbes médicinales et des produits de médecine douce.
- Vous ne devriez pas prendre de laxatif dans les deux (2) heures suivant la prise d'un autre médicament puisque l'effet prévu de l'autre médicament pourrait être amoindri.

#### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Les médicaments pouvant causer des interactions avec DULCOLAX comprennent : diurétiques, adrénocorticoïdes, glucosides cardiaques, antiacides ou certains inhibiteurs de la pompe à protons.

Ne pas prendre des médicaments pour l'indigestion au même moment de la journée que les dragées DULCOLAX. Ne pas prendre les dragées DULCOLAX avec du lait.

#### UTILISATION ADÉQUATE DU MÉDICAMENT

**Ne pas prendre une dose supérieure à la dose quotidienne recommandée. Ne pas prendre pendant plus d'une semaine sans consulter un médecin.**

##### Dose habituelle :

Pour le soulagement de la constipation :

Adultes et enfants de plus de 12 ans : Une à deux dragées

Enfants de 6 à 12 ans : Une dragée

Enfants de moins de 6 ans : Utiliser conformément aux directives du médecin.

Prendre les dragées DULCOLAX au coucher pour produire une défécation le lendemain matin.

Les dragées devraient être avalées en entier avec une quantité suffisante de liquide (SAUF DU LAIT).

### **Surdosage :**

Si des doses élevées sont administrées, des selles liquides (diarrhée), des crampes abdominales et une perte considérable de potassium et d'autres minéraux peuvent survenir.

Un surdosage chronique au DULCOLAX peut causer une diarrhée chronique, une douleur abdominale, des lésions rénales et une faiblesse musculaire.

En cas de surdosage, consultez immédiatement votre médecin, votre pharmacien ou le centre anti-poisons de votre région.

### **EFFETS SECONDAIRES ET MESURES À PRENDRE**

Certains patients prenant du DULCOLAX ont présenté des malaises abdominaux (y compris des crampes abdominales, une douleur abdominale, des nausées ou de la diarrhée). Des réactions allergiques ont également été rapportées.

*Cette liste d'effets secondaires n'est pas complète. Si vous éprouvez des effets indésirables pendant votre traitement par DULCOLAX, veuillez communiquer avec votre médecin ou votre pharmacien.*

### **ENTREPOSAGE**

Garder hors de la portée des enfants. Garder dans un endroit frais et sec à la température de la pièce (15 à 30 °C).

### **RAPPORT D'EFFETS SECONDAIRES SOUPÇONNÉS**

Afin de surveiller l'innocuité des médicaments, Santé Canada recueille des renseignements sur les effets inattendus et graves des médicaments par l'entremise du Programme Canada Vigilance. Si vous croyez que vous avez eu une réaction inattendue ou grave à ce médicament, vous pouvez en faire mention à Canada Vigilance :

Par téléphone (numéro sans frais) : 866 234-2345  
Par télécopieur (numéro sans frais) : 866 678-6789  
En ligne : [www.santecanada.gc.ca/medeffet](http://www.santecanada.gc.ca/medeffet)  
Par courriel : [CanadaVigilance@hc-sc.gc.ca](mailto:CanadaVigilance@hc-sc.gc.ca)

Par courrier :  
Centre national Canada Vigilance  
Division de l'information sur l'innocuité et l'efficacité des produits de santé commercialisés  
Direction des produits de santé commercialisés  
Direction générale des produits de santé et des aliments  
Santé Canada  
Pré Tunney, IA : 0701C  
Ottawa (Ontario) K1A 0K9

*REMARQUE : Si vous avez besoin d'information au sujet de la prise en charge d'un effet secondaire, communiquez avec votre professionnel de la santé avant de communiquer avec Canada Vigilance. Le Programme Canada Vigilance ne vise pas à fournir des conseils d'ordre médical.*

### **POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS**

Ce document et la monographie de produit complète (ou guide thérapeutique) préparés à l'intention des professionnels de la santé peuvent être obtenus à l'adresse suivante :  
<http://www.boehringer-ingelheim.ca> ou en communiquant avec la compagnie Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée au 1-800-263-5103, poste 4633 (Information médicale).

Veuillez consulter notre site web pour toute information récente.

Ce dépliant a été préparé par Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée.

Dernière révision : 18 décembre 2008