

## PARTIE III : RENSEIGNEMENTS POUR LE CONSOMMATEUR

### Persantine Dipyridamole

Ce dépliant forme la troisième partie d'une «Monographie de produit» en trois parties publiée à la suite de l'approbation Persantine pour la vente au Canada, et est destiné spécifiquement aux consommateurs. Ce dépliant sert de résumé et, par conséquent, ne contient pas tous les renseignements disponibles au sujet de Persantine. Veuillez communiquer avec votre médecin ou votre pharmacien si vous avez des questions concernant ce médicament.

#### AU SUJET DE CE MÉDICAMENT

##### À quoi sert ce médicament :

Les comprimés de Persantine sont indiqués dans la prévention des complications thromboemboliques post-opératoires associées au remplacement prothétique des valvules cardiaques.

##### Comment agit ce médicament :

Persantine dilate les vaisseaux sanguins du muscle cardiaque et contrôle la tendance des globules plus nombreux à s'agréger. Il agit en empêchant la formation excessive de caillots de sang.

##### Quand ne devrait-on pas utiliser ce médicament :

Persantine ne devrait pas être utilisé par les patients ayant des réactions allergiques au dipyridamole ou aux composants du produit.

##### Ingrédient actif :

Dipyridamole

##### Ingrédients non médicinaux :

Gomme arabique, hydrogénophosphate de calcium, cire de carnauba, silice colloïdale, jaune orangé S, stéarate de magnésium, polyéthylèneglycol, amidon, sucrose, talc, bioxyde de titane, cire blanche, oxyde rouge de fer.

##### Présentation :

Persantine est offert sous forme de comprimé administré par voie orale. Les comprimés sont à 50 mg ou 75 mg.

#### MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS

**AVANT de prendre Persantine, vous devriez discuter avec votre médecin ou pharmacien si :**

- § Vous êtes allergique au dipyridamole ou à tout autre médicament.
- § Vous prenez d'autres médicaments remis sur ordonnance ou non, en particulier l'aspirine (AAS).
- § Vous avez ou avez déjà eu des troubles cardiaques, de l'hypotension ou des problèmes respiratoires.

- § Vous êtes enceinte, prévoyez le devenir ou si vous allaitez. Si vous devenez enceinte pendant que vous prenez Persantine, consultez votre médecin.
- § Vous devez subir une opération chirurgicale, y compris une chirurgie dentaire, avisez le médecin ou le dentiste que vous prenez Persantine.

Une aggravation des symptômes de maladie cardiaque a été observée chez certains patients.

#### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Les médicaments qui peuvent affecter l'efficacité de Persantine comprennent : adénosine, autres médicaments qui empêchent la formation de caillots sanguins, antihypertenseurs et inhibiteurs de la cholinestérase.

#### UTILISATION ADÉQUATE DU MÉDICAMENT

##### Dose habituelle :

La dose habituelle de 100 mg est prise quatre fois par jour, une heure avant les repas. Parfois, une dose plus faible de 100 mg par jour de Persantine est prise avec 1,0 g d'acide acétylsalicylique (AAS). Suivre les directives du médecin, et poser toute question à un médecin ou un pharmacien.

##### Surdosage :

En cas de surdosage, communiquez immédiatement avec votre médecin ou faites le 911.

##### Omission de dose :

Prenez la dose oubliée dès que vous vous en souvenez. Toutefois, s'il est presque temps de prendre la dose suivante, sautez la dose oubliée et poursuivez votre horaire habituel de prise de doses. Ne doublez pas la dose.

## EFFETS SECONDAIRES ET MESURES À PRENDRE

Les effets secondaires observés aux doses prescrites de Persantine sont habituellement minimes et passagers. Un malaise gastrique léger et occasionnel peut être évité en prenant les comprimés avec un verre de lait. Avisez votre médecin si les symptômes suivants sont graves ou ne se résorbent pas après un certain temps : étourdissements, douleur gastrique, mal de tête, éruption, diarrhée, vomissements, sensation de chaleur ou faiblesse. Si vous présentez l'un des symptômes suivants, communiquez immédiatement avec votre médecin : saignement ou ecchymose inhabituels, douleur thoracique, augmentation de la fréquence cardiaque, diminution de la tension artérielle, ou réactions allergiques – respiration difficile, bronchospasme grave ou œdème.

Dans les rares cas où les effets secondaires étaient persistants ou intolérables, l'interruption du médicament a permis de faire disparaître les effets secondaires indésirables. Ne cessez pas de prendre les comprimés sans discuter d'abord avec votre médecin.

Symptôme / effet	Consultez votre médecin ou votre pharmacien	
	Seulement pour les effets secondaires graves	Dans tous les cas
Étourdissements, douleur gastrique, mal de tête, éruption, diarrhée, vomissements, sensation de chaleur, faiblesse	T	
Saignement ou ecchymose inhabituel, douleur thoracique, augmentation de la fréquence cardiaque, diminution de la tension artérielle, réaction allergique (respiration difficile, bronchospasme grave ou œdème)		T

*Cette liste d'effets secondaires n'est pas complète. Si vous éprouvez des effets indésirables pendant votre traitement par Persantine, veuillez communiquer avec votre médecin ou votre pharmacien.*

## ENTREPOSAGE

Garder ce médicament dans son contenant original, bien fermé, et hors de la portée des enfants. Le conserver à la température de la pièce (15 – 30 °C) et à l'abri de la chaleur excessive et de l'humidité (pas dans la salle de bains). Garder à l'abri de la lumière et du gel. Ne laissez personne d'autre utiliser votre médicament.

## RAPPORT D'EFFETS SECONDAIRES

Afin d'assurer l'innocuité des médicaments, Santé Canada recueille des renseignements sur les effets graves et indésirables des médicaments. Si vous croyez avoir eu une réaction grave ou indésirable à ce médicament, veuillez en aviser Santé Canada :

Téléphone sans frais : (866) 234-2345

Télécopieur sans frais : (866) 678-6789

Courriel : [cadrmp@hc-sc.gc.ca](mailto:cadrmp@hc-sc.gc.ca)

Adresse postale :

Centre nationale des EI

Division de l'information sur l'innocuité

et l'efficacité des produits de santé commercialisés

Direction des produits de santé commercialisés

Pré Tunney, IA : 0701C

Ottawa (ON) K1A 0K9

*REMARQUE : Avant de communiquer avec Santé Canada, vous devriez communiquer avec votre médecin ou votre pharmacien.*

## POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS

Ce document et la monographie de produit complète préparés à l'intention des professionnels de la santé peuvent être obtenus à l'adresse suivante : <http://www.boehringer-ingelheim.ca> ou en communiquant avec le commanditaire, Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée, au 1-800-263-5103, poste 4633 (Information médicale).

Ce dépliant a été préparé par Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée.

Dernière révision : le 20 mai 2005.